



ESQUEMAS VACINAS COVID-19



PESSOAS ACIMA DE 18 ANOS - IMUNOCOMPETENTE - NÃO GESTANTE

	Dose 2 (D2)	Dose Reforço (DR)	
		Intervalo	Imunizante
Coronavac	28 dias após D1	4 meses após D2	A vacina deverá ser, preferencialmente, da plataforma de RNA mensageiro (Comirnaty/Pfizer) ou, de maneira alternativa, vacina de vetor viral (Janssen ou AstraZeneca)
Astrazeneca	10 semanas após D1	4 meses após D2	A vacina deverá ser, preferencialmente, da plataforma de RNA mensageiro (Comirnaty/Pfizer) ou, de maneira alternativa, vacina de vetor viral (Janssen ou AstraZeneca)
Pfizer	8 semanas após D1	4 meses após D2	A vacina deverá ser, preferencialmente, da plataforma de RNA mensageiro (Comirnaty/Pfizer) ou, de maneira alternativa, vacina de vetor viral (Janssen ou AstraZeneca)
Janssen	NÃO Indicada	2 meses após D1	Janssen

PESSOAS ACIMA DE 18 ANOS - IMUNOSSUPRIMIDO - NÃO GESTANTE

	Dose 2 (D2)	Dose adicional		Reforço	
		Intervalo	Imunizante	Intervalo	Imunizante
Coronavac	28 dias após D1	28 dias após D2	A vacina deverá ser, preferencialmente, da plataforma de RNA mensageiro (Comirnaty/Pfizer) ou, de maneira alternativa, vacina de vetor viral (Janssen ou AstraZeneca)	4 meses após dose adicional	A vacina deverá ser, preferencialmente, da plataforma de RNA mensageiro (Comirnaty/Pfizer) ou, de maneira alternativa, vacina de vetor viral (Janssen ou AstraZeneca)
Astrazeneca	10 semanas após D1	28 dias após D2	A vacina deverá ser, preferencialmente, da plataforma de RNA mensageiro (Comirnaty/Pfizer) ou, de maneira alternativa, vacina de vetor viral (Janssen ou AstraZeneca)	4 meses após dose adicional	A vacina deverá ser, preferencialmente, da plataforma de RNA mensageiro (Comirnaty/Pfizer) ou, de maneira alternativa, vacina de vetor viral (Janssen ou AstraZeneca)
Pfizer	8 semanas após D1	28 dias após D2	A vacina deverá ser, preferencialmente, da plataforma de RNA mensageiro (Comirnaty/Pfizer) ou, de maneira alternativa, vacina de vetor viral (Janssen ou AstraZeneca)	4 meses após dose adicional	A vacina deverá ser, preferencialmente, da plataforma de RNA mensageiro (Comirnaty/Pfizer) ou, de maneira alternativa, vacina de vetor viral (Janssen ou AstraZeneca)
Janssen*	NÃO Indicada	28 dias após D1	Janssen	4 meses após dose adicional	A vacina deverá ser, preferencialmente, da plataforma de RNA mensageiro (Comirnaty/Pfizer) ou, de maneira alternativa, vacina de vetor viral (Janssen ou AstraZeneca)

*** PACIENTE COM SEGUINTE ESQUEMA:**

D1: Janssen
DA: Pfizer

Recebe DR com intervalo de 4 meses da DA.
Neste casos a DR deverá ser preferencialmente, da plataforma de RNA mensageiro (Comirnaty/Pfizer) ou, de maneira alternativa, vacina de vetor viral (Janssen ou AstraZeneca)

PESSOAS ACIMA DE 18 ANOS - GESTANTE

	Dose 2 (D2)	Dose Reforço (DR)	
		Intervalo	Imunizante
Coronavac	28 dias após D1	5 meses após D2	Pfizer
Pfizer	8 semanas após D1	5 meses após D2	Pfizer

ADOLESCENTES (12 A 17 ANOS)

	Dose 2 (D2)	Dose Adicional (DA)	Dose Reforço (DR)
Pfizer	8 semanas após D1	-	Não indicado
Pfizer *Imunossuprimidos	8 semanas após D1	28 dias após D2	Não indicado