

# CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO DA REDE PÚBLICA DE SANTA CATARINA

Atualizado em 31 de julho de 2014

Grupo alvo	Idade	BCG	Hepatite B <sup>(1)</sup>	VIP e VOP	Pentavalente	Pneumo 10	Rotavírus <sup>(2)</sup>	Meningo C	Hepatite A	Febre Amarela <sup>(3)</sup>	Tríplice Viral <sup>(4)</sup>	Tetraviral <sup>(5)</sup>	HPV	Dupla Adulto <sup>(6)</sup>
Criança	Ao nascer	Dose única	Dose ao nascer											
	2 meses			1ª dose (com VIP)	1ª dose	1ª dose	1ª dose							
	3 meses							1ª dose						
	4 meses			2ª dose (com VIP)	2ª dose	2ª dose	2ª dose							
	5 meses							2ª dose						
	6 meses			3ª dose (com VOP)	3ª dose	3ª dose								
	9 meses									Dose inicial				
	12 meses					Reforço		Reforço	Dose única		1ª dose			
	15 meses			1º reforço (com VOP)	1ª reforço (com DTP)							Dose única		
	4 anos			2ª reforço (com VOP)	2ª reforço (com DTP)									
Adolescente	11 a 13 anos												0, 6 e 60 meses	
	10 a 19 anos		3 doses							Uma dose a cada 10 anos	2 doses			Reforço a cada 10 anos
Adulto	20 a 59 anos		3 doses (até 49 anos)							Uma dose a cada 10 anos	1 dose (até 49 anos)			Reforço a cada 10 anos
Idoso	60 anos ou mais													Reforço a cada 10 anos
Gestante			3 doses											3 doses <sup>(7)</sup>

(1) Hepatite B: Até 49 anos, fazer 3(três) doses se não vacinado anteriormente ou completar esquema já iniciados. Grupos com Indicação de CRIE, em qualquer idade (podendo ter nº de doses e volume diferenciados).

(2) Rotavírus: Primeira dose aos 2 meses (de 1 mês e 15 dias a 3 meses e 15 dias) e segunda dose aos 4 meses (3 meses e 15 dias a 7 meses e 29 dias). Manter intervalo mínimo de 30 dias entre as doses.

(3) Febre Amarela: Indicação de vacinação para 100% da população em 162 municípios pertencentes a Área com Recomendação de Vacina (ACRV). Fazer um reforço a cada 10 anos.

(4) Tríplice Viral: Indivíduo até 19 anos deve ter 2 doses (componente SRC). De 20 a 49 anos, se não vacinados anteriormente, fazer uma dose.

(5) Tetraviral: Em crianças de 15 a 23 meses e 29 dias, nascidas a partir de 01/06/2012, que já tenham feito uma dose de Tríplice Viral, com intervalo mínimo de 30 dias.

(6) Dupla Adulto: Reforço para aqueles que têm 3 doses da vacina DTP ou tetravalente (DTP+Hib) ou dupla adulto; 3 doses se não vacinados anteriormente ou completar esquema já iniciado.

(7) Dupla Adulto: Para a grávida e em casos de ferimentos de alto risco, o reforço é realizado a partir de 5 anos da última dose do esquema.

CALENDÁRIO SUJEITO A ATUALIZAÇÕES

